


ロタリックス®内用液 接種前にお読みください

ロタリックス®内用液とは？

ロタリックス®内用液は自然感染を模倣したヒト由来の弱毒生ワクチンであるため、腸管内で十分に増え、抵抗力(免疫)を獲得します。



Point

ワクチンの全量を飲み込めない場合もありますが、飲み込みが確認できていれば、効果が期待できます。



うまく飲んでもらうためには…

接種直前(30分以内)には授乳を控えましょう。

※ロタリックス®の接種には母乳等の摂取に制限はありませんが、接種後の吐き戻しを避けるために授乳を控えましょう。


こんなことがあっても大丈夫(接種後から10分程度)



＊
国内外でのロタウイルスワクチン発売後の調査から、接種後に腸重積症のリスクが少し増加する可能性があるとしてされています。接種回にかかわらず接種後（特に1週間）は腸重積症の症状にご注意ください。

腸重積症とは？

- ＊ ● 腸の一部が腸のほかの部分に入り込んでしまう、緊急性の高い病気です。
- ワクチン接種の有無にかかわらず、1歳前（0歳）のお子さんがかかることが多い病気です。



ロタウイルスワクチン接種の有無にかかわらず以下の症状に注意しましょう

- ＊ 泣いたり不機嫌になったりを繰り返す
- おう吐を繰り返す
- ぐったりして顔色が悪くなる
- 血便が出る

上記の症状が1つでもみられた場合は、
腸重積症が疑われるため、

＊
速やかに受診してください